

Incretinemimetica of GLP-1-receptoragonisten in België verkrijgbaar anno 2022

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<p>GLP-1-receptoragonisten (GLP-1-analogen)</p> <p><i>Inwerken op het incretinesysteem</i></p>	Dulaglutide	Trulicity® (langwerkend)	<p>Wekelijks subcutaan een dosis (0,75 of 1,5 mg) toedienen via een voorgevulde pen (1 voorgevulde pen = 1 dosis)</p> <p>Onafhankelijk van de maaltijd, altijd op dezelfde dag van de week</p> <p>Voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gewichtsreductie - gering risico op hypoglycemie - verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk - verminderen de eetlust - gunstige cardiorenale effecten <p>Nadeel: gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. braken, misselijkheid, diarree, buikpijn, winderigheid)</p> <p>Opletten: niet geschikt bij ernstige verteringsproblemen (incl. gastroparese) en dosisaanpassing naargelang nierfunctie</p> <p>Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<p>GLP-1-receptoragonisten (GLP-1-analogen) (vervolg)</p> <p><i>Inwerken op het incretinesysteem</i></p>	Exenatide	Byetta® (kortwerkend)	<p>Dagelijks subcutaan tweemaal een dosis (10 of 20 µg) toedienen via een voorgevulde pen (meerdere toedieningen met zelfde voorgevulde pen)</p> <p>1x binnen het uur voor het ontbijt en 1x binnen het uur voor de avondmaaltijd</p> <p>Voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gewichtsreductie - gering risico op hypoglycemie - verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk - verminderen de eetlust <p>Nadeel: gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. braken, misselijkheid, diarree, buikpijn, winderigheid)</p> <p>Opletten: niet geschikt bij ernstige verteringsproblemen (incl. gastroparese) en dosisaanpassing naargelang nierfunctie</p> <p>Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<p>GLP-1-receptoragonisten (GLP-1-analogen) (vervolg)</p> <p><i>Inwerken op het incretinesysteem</i></p>	Exenatide	Bydureon® (langwerkend)	<p>Wekelijks subcutaan een dosis (2 mg) toedienen via een voorgevulde pen (1 voorgevulde pen = 1 dosis) Onafhankelijk van de maaltijd</p> <p>Voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gewichtsreductie - gering risico op hypoglycemie - verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk - verminderen de eetlust <p>Nadeel: gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. braken, misselijkheid, diarree, buikpijn, winderigheid)</p> <p>Opletten: niet geschikt bij ernstige verteringsproblemen (incl. gastroparese) en dosisaanpassing naargelang nierfunctie</p> <p>Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<p>GLP-1-receptoragonisten (GLP-1-analogen) (vervolg)</p> <p><i>Inwerken op het incretinesysteem</i></p>	Liraglutide	Victoza® (middellangwerkend)	<p>Dagelijks subcutaan voorgeschreven dosis (0,6 of 1,8 mg) toedienen via een voorgevulde pen (meerdere toedieningen met zelfde voorgevulde pen) Onafhankelijk van de maaltijd, op hetzelfde tijdstip</p> <p>Voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gewichtsreductie - gering risico op hypoglycemie - verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk - verminderen de eetlust - gunstige cardiorenale effecten <p>Nadeel: gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. braken, misselijkheid, diarree, buikpijn, winderigheid)</p> <p>Opletten: niet geschikt bij hartfalen en ernstige maag-darmproblemen, dosisaanpassing naargelang nierfunctie</p> <p>Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<p>GLP-1-receptoragonisten (GLP-1-analogen) (vervolg)</p> <p><i>Inwerken op het incretinesysteem</i></p>	Lixisenatide	Lyxumia® (kortwerkend)	<p>Dagelijks subcutaan een dosis (20 µg) toedienen via een voorgevulde pen (meerdere toedieningen met zelfde voorgevulde pen) Binnen het uur voor het ontbijt of voor de avondmaaltijd</p> <p>Voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gewichtsreductie - gering risico op hypoglycemie - verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk - verminderen de eetlust <p>Nadelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. braken, misselijkheid, diarree, buikpijn, winderigheid) - hoofdpijn <p>Opletten: Niet geschikt bij ernstige verteringsproblemen (incl. gastroparese) en dosisaanpassing naargelang nierfunctie</p> <p>Enkel via injectie beschikbaar, terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<p>GLP-1-receptoragonisten (GLP-1-analogen) (vervolg)</p> <p><i>Inwerken op het incretinesysteem</i></p>	Semaglutide	Ozempic® (langwerkend)	<p>Wekelijks subcutaan een dosis (0,5 of 1 mg) toedienen via een voorgevulde pen (meerdere toedieningen met zelfde voorgevulde pen) Onafhankelijk van de maaltijden.</p> <p>Voordelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - gewichtsreductie - gering risico op hypoglycemie - verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk - verminderen de eetlust <p>Nadelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. misselijkheid, braken, diarree) - vertraagde maaglediging <p>Opletten: dosisaanpassing naargelang nierfunctie</p> <p>Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
GLP-1-receptoragonisten (GLP-1-analogen) (vervolg) <i>Inwerken op het incretinesysteem</i>	Semaglutide	Rybelsus® (langwerkend)	<p>Dagelijks orale inname (3 of 7 of 14 mg). Inname op lege maag met een slok water (max. half glas water) Na inname ten minste 30 min. wachten met eten, drinken of inname andere orale medicatie. Tabletten mogen niet gebroken, geplet of gekauwd worden.</p> <p>Voordelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - gewichtsreductie - gering risico op hypoglycemie - verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk - verminderen de eetlust <p>Nadelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. misselijkheid, braken, diarree) - vertraagde maaglediging <p>Opletten: dosisaanpassing naargelang nierfunctie Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

De combinaties van een incretinemimeticum met insuline zijn opgenomen in de oplistings van de insulinesoorten.

TIP:

Alle patiëntenbijsluiters van de geneesmiddelen op de Belgische markt zijn online beschikbaar op de website van het FAGG: www.fagg-afmps.be.