

Incretinemimetica of GLP-1-receptoragonisten in België verkrijgbaar anno 2025

Klasse	Generische naam	Merksnaam	Aandachtspunten
GLP-1-receptoragonisten (GLP-1-analogen) <i>Inwerken op het incretinesysteem</i>	Dulaglutide	Trulicity® (langwerkend)	<p>Wekelijks subcutaan een dosis (0,75 of 1,5 mg) toedienen via een voorgevulde pen (1 voorgevulde pen = 1 dosis)</p> <p>Onafhankelijk van de maaltijd, altijd op dezelfde dag van de week</p> <p>Voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ gewichtsreductie ○ gering risico op hypoglycemie ○ verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk ○ verminderen de eetlust ○ gunstige cardiorenale effecten <p>Nadeel: gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. braken, misselijkheid, diarree, buikpijn, winderigheid) - Opletten: niet geschikt bij ernstige verteringsproblemen (incl. gastroparese) en dosisaanpassing naargelang nierfunctie</p> <p>Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<p>GLP-1-Receptor-agonisten (GLP-1-analogen) (vervolg)</p> <p><i>Inwerken op het incretinesysteem</i></p>	Liraglutide	Victoza® (middellangwerkend)	<p>Dagelijks subcutaan voorgeschreven dosis (0,6 of 1,8 mg) toedienen via een voorgevulde pen (meerdere toedieningen met zelfde voorgevulde pen) Onafhankelijk van de maaltijd, op hetzelfde tijdstip</p> <p>Voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> o gewichtsreductie o gering risico op hypoglycemie o verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk o verminderen de eetlust o gunstige cardiorenale effecten <p>Nadeel: gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. braken, misselijkheid, diarree, buikpijn, winderigheid)</p> <p>Opletten: niet geschikt bij hartfalen en ernstige maag- darmproblemen, dosisaanpassing naargelang nierfunctie</p> <p>Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<p>GLP-1-Receptor-agonisten (GLP-1-analogen) (vervolg)</p> <p><i>Inwerken op het incretinesysteem</i></p>	Lixisenatide	Lyxumia® (kortwerkend)	<p>Dagelijks subcutaan een dosis (20 µg) toedienen via een voorgevulde pen (meerdere toedieningen met zelfde voorgevulde pen) Binnen het uur voor het ontbijt of voor de avondmaaltijd</p> <p>Voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ gewichtsreductie ○ gering risico op hypoglycemie ○ verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk ○ verminderen de eetlust <p>Nadeel: gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. braken, misselijkheid, diarree, buikpijn, winderigheid) hoofdpijn</p> <p>Opletten: Niet geschikt bij ernstige verterings-problemen (incl. gastroparese) en dosisaanpassing naargelang nierfunctie</p> <p>Enkel via injectie, terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<p>GLP-1- Receptor- agonisten (GLP-1- analogen) (vervolg)</p> <p><i>Inwerken op het incretinesysteem</i></p>	Semaglutide	Ozempic® (langwerkend)	<p>Wekelijks subcutaan een dosis (0,5 of 1 mg) toedienen via een voorgevulde pen (meerdere toedieningen met zelfde voorgevulde pen) Onafhankelijk van de maaltijden.</p> <p>Voordelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - gewichtsreductie o gering risico op hypoglycemie o verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk o verminderen de eetlust <p>Nadelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> o gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. misselijkheid, braken, diarree) o vertraagde maaglediging <p>Opletten: dosisaanpassing naargelang nierfunctie</p> <p>Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<p>GLP-1-receptoragonisten (GLP-1-analogen) (vervolg)</p> <p><i>Inwerken op het incretinesysteem</i></p>	Semaglutide	Rybelsus® (langwerkend)	<p>Dagelijks orale inname (3 of 7 of 14 mg). Inname op lege maag met een slok water (max. half glas water) Na inname ten minste 30 min. wachten met eten, drinken of inname andere orale medicatie.</p> <p>Tabletten mogen niet gebroken, geplet of gekauwd worden.</p> <p>Voordelen</p> <ul style="list-style-type: none"> o gewichtsreductie o gering risico op hypoglyceie o verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk - verminderen de eetlust <p>Nadelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> o gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. misselijkheid, braken, diarree) o vertraagde maaglediging <p>Opletten: dosisaanpassing naargelang nierfunctie Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
Gecombineerde GIP/GLP-1-analogen	Tirzepatide	Mounjaro®	<p>Dagelijks orale inname (3 of 7 of 14 mg). Inname op lege</p> <p>Startdosis van 2,5 mg (1x/week). Na 4 weken verhogen tot 5 mg (1x/week). Aanbevolen onderhoudsdoses zijn 5, 10 en 15 mg. Maximale dosering is 15 mg (1x/week)</p> <p>Momenteel niet terugbetaald in België (04/2025).</p>

De combinaties van een incretinemimeticum met insuline zijn opgenomen in de olijsting van de insulinesoorten.

TIP:

Alle patiëntenbijsluiters van de geneesmiddelen op de Belgische markt zijn online beschikbaar op de website van het

FAGG: www.fagg-afmps.be.