

## Orale bloedsuikerverlagende medicatie bij diabetes type 2 in België verkrijgbaar anno 2025

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<b>Biguaniden</b>  <i>Verlagen hepatische glucoseproductie</i>  <i>Vertragen opnamesnelheid van glucose vanuit de darm</i>	Metformine	Metformine EG® Metformine Sandoz® Metformine Viatrix® Metformax®	<b>Inname:</b> tijdens of na de maaltijd.  <b>Voordelen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>× geen hypoglycemie</li> <li>× geen gewichtstoename</li> <li>× gunstig effect op cardiovasculaire complicaties</li> </ul> <b>Nadelen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>× gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. misselijkheid, braken, diarree, verminderde eetlust)</li> <li>× lactaatacidose (zeldzaam)</li> </ul> <b>Opletten:</b> Niet geschikt bij ernstige nierinsufficiëntie, leverproblemen en hartfalen.
<b>Gliniden</b>  <i>Stimuleren insulinesecretie</i>	Repaglinide	Novonorm® Repaglinide EG®  Korte werkingsduur (ongeveer 2 uur)	<b>Inname:</b> direct voor of tot 30 minuten voor de maaltijd. Bij overslaan van een maaltijd niet innemen.  <b>Nadelen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>× hypoglycemie</li> <li>× lichte gewichtstoename</li> <li>× doorgaans veel pilletjes nodig</li> </ul> <b>Opletten:</b> Niet geschikt bij leverproblemen. Geen extra gunstig cardiovasculair effect boven op de glycemiedaling.

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<b>Sulfonylurea</b>  <i>Stimuleren insulinesecretie</i>	Gliclazide	Uni Diamicon® Uni Gliclazide EG® Gliclazide Sandoz®  Lange werkingsduur	<p><b>Inname:</b> eenmaal per dag voor de maaltijd (normaal ontbijt). Bij overslaan maaltijd niet innemen.</p> <p><b>Voordeel:</b> nefroprotectief effect (gliclazide met vertraagde vrijstelling)</p> <p><b>Nadelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× hypoglycemie</li> <li>× gewichtstoename</li> </ul> <p><b>Opletten:</b> Niet geschikt bij ernstige nierinsufficiëntie en leverproblemen. Geen extra gunstig cardiovasculair effect boven op de glycemiedaling.</p>
	Glimepiride	Glimepiride EG® Glimepiride Sandoz®  Lange werkingsduur	<p><b>Inname:</b> 's morgens, net voor of samen met de maaltijd. Bij overslaan van een maaltijd niet innemen.</p> <p><b>Nadelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× hypoglycemie</li> <li>× gewichtstoename</li> </ul> <p><b>Opletten:</b> Niet geschikt bij ernstige nierinsufficiëntie en leverproblemen. Geen extra gunstig cardiovasculair effect boven op de glycemiedaling.</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<b>Glitazonen</b> <i>(Thiazolidinediones)</i>  <i>Verminderen insulineresistentie t.h.v. s+ keletspieren</i>	Pioglitazon	Actos®	<p><b>Inname:</b> op vast tijdstip, niet gebonden aan maaltijd.</p> <p><b>Voordelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× geen hypoglycemie</li> <li>× mogelijk gunstig effect op atheromateuze cardiovasculaire events</li> </ul> <p><b>Nadelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× gewichtstoename</li> <li>× oedemen</li> </ul> <p><b>Opletten:</b> Niet geschikt bij leverproblemen en hartfalen. Niet te combineren met insuline.</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<b>PP-4-inhibitoren</b> <i>(Gliptinen)</i>  <i>Stimuleren insulineafgifte</i>  <i>Verminderen glucagonafgifte</i>  <i>Verminderen eetlust</i>  <i>Vertragen maaglediging</i>	Alogliptine	Vipidia®	<p><b>Inname:</b> bij of los van de maaltijd, eenmaal per dag op een vast tijdstip.</p> <p><b>Voordelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× gewichtsneutraal</li> <li>× gering risico op hypoglycemie</li> </ul> <p><b>Nadeel:</b> lichte gastro-intestinale stoornissen (o.a. misselijkheid, braken, diarree)</p> <p><b>Opletten:</b> dosisaanpassing naargelang nierfunctie. Geen extra gunstig cardiovasculair effect boven op de glycemiedaling.</p>
	Linagliptine	Trajenta®	<p><b>Inname:</b> bij of los van de maaltijd, eenmaal per dag op vast tijdstip.</p> <p><b>Voordelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× gewichtsneutraal</li> <li>× gering risico op hypoglycemie</li> <li>× geen dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie</li> </ul> <p><b>Nadeel:</b> lichte gastro-intestinale stoornissen (o.a. misselijkheid, braken, diarree)</p> <p><b>Opletten:</b> niet gebruiken bij leverproblemen. Geen extra gunstig cardiovasculair effect boven op de glycemiedaling.</p>
	Saxagliptine	Onglyza®	<p><b>Inname:</b> bij of los van de maaltijd, eenmaal per dag op vast tijdstip.</p> <p><b>Voordelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× gewichtsneutraal</li> <li>× gering risico op hypoglycemie</li> </ul> <p><b>Nadelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× lichte gastro-intestinale stoornissen (o.a. misselijkheid, braken, diarree)</li> </ul> <p><b>Opletten:</b> dosisaanpassing naargelang nierfunctie. Geen extra gunstig cardiovasculair effect boven op de glycemiedaling. Niet toedienen bij voorgeschiedenis van hartfalen.</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<b>DPP-4-inhibitoren</b> <i>(Gliptinen)</i>  <i>Stimuleren insulineafgifte</i>  <i>Verminderen glucagonafgifte</i>  <i>Verminderen eetlust</i>  <i>Vertragen maaglediging</i>	Sitagliptine	Januvia® Sitagliptin EG® Sitagliptine Krka® Sitagliptin Grindeks® Sitagliptin Sandoz®	<p><b>Inname:</b> bij of los van de maaltijd, eenmaal per dag.</p> <p><b>Voordelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× gewichtsneutraal</li> <li>× gering risico op hypoglycemie</li> </ul> <p><b>Nadeel:</b> lichte gastro-intestinale problemen (o.a. misselijkheid, braken, diarree)</p> <p><b>Opletten:</b> dosisaanpassing naargelang nierfunctie. Geen extra gunstig cardiovasculair effect boven op de glycemiedaling.</p>
	Vildagliptine	Galvus®	<p><b>Inname:</b> bij of los van de maaltijd, maximaal tweemaal per dag ('s morgens en 's avonds)</p> <p><b>Voordelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× gewichtsneutraal</li> <li>× gering risico op hypoglycemie</li> </ul> <p><b>Nadeel:</b> lichte gastro-intestinale stoornissen (o.a. misselijkheid, braken, diarree)</p> <p><b>Opletten:</b> dosisaanpassing naargelang nierfunctie. Geen extra gunstig cardiovasculair effect boven op de glycemiedaling.</p>

K+sse	Generische naam	Merksnaam	Aandachtspunten
<b>GLP-1-receptoragonisten</b> <i>(GLP-1-analogen)</i>  <i>Werken in op incretinesysteem</i>	Semaglutide	Rybelsus® (langwerkend)	<p><b>Dagelijks orale inname</b> (3 of 7 of 14 mg). Inname op lege maag met een slok water (max. half glas water) Na inname ten minste 30 min. wachten met eten, drinken of inname andere orale medicatie.</p> <p>Tabletten mogen niet gebroken, geplet of gekauwd worden.</p> <p><b>Voordelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gewichtsreductie</li> <li>- gering risico op hypoglycemie</li> <li>- verbeterd lipidenprofiel en daling bloeddruk</li> <li>- verminderen eetlust</li> </ul> <p><b>Nadelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gastro-intestinale stoornissen vnl. bij opstart (o.a. misselijkheid, braken, diarree)</li> <li>- vertraagde maaglediging</li> </ul> <p><b>Opletten:</b> dosisaanpassing naargelang nierfunctie Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<b>SGLT-2-inhibitoren</b> <i>(Gliflozinen)</i>  <i>Verhinderen reabsorptie van glucose en natrium in de renale tubuli</i>	Canagliflozine	Invokana®	<p>Eenmaal per dag <b>Inname:</b> , bij voorkeur voor de eerste maaltijd van de dag.</p> <p><b>Voordelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× gering risico op hypoglycemie</li> <li>× gewichtsreductie</li> <li>× gunstig effect op de bloeddruk</li> <li>× gunstige cardiorenale effecten</li> </ul> <p><b>Nadelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× genitale schimmelinfectie</li> <li>× mogelijk orthostatisme (vooral bij ouderen)</li> </ul> <p><b>Opletten:</b> Niet geschikt bij ernstige nierinsufficiëntie en leverproblemen.</p>
	Dapagliflozine	Forxiga®	<p><b>Inname:</b> bij of los van de maaltijd, eenmaal per dag</p> <p><b>Voordelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× gering risico op hypoglycemie/gewichtsreductie</li> <li>× gunstig effect op de bloeddruk</li> <li>× gunstige cardiorenale effecten</li> </ul> <p><b>Nadelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× genitale schimmelinfectie</li> <li>× mogelijk orthostatisme (vooral bij ouderen)</li> </ul> <p><b>Opletten:</b> Niet geschikt bij ernstige nierinsufficiëntie en leverproblemen.</p> <p>Forxiga® 5 mg wordt niet terugbetaald.</p>

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<p><b>SGLT-2-inhibitoren</b> (Gliflozinen)</p> <p><i>Verhinderen reabsorptie van glucose en natrium in de renale tubuli</i></p>	Empagliflozine	Jardiance®	<p><b>Inname:</b> bij of los van de maaltijd, eenmaal per dag</p> <p><b>Voordelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× gering risico op hypoglycemie/gewichtsreductie</li> <li>× positief effect op de bloeddruk</li> <li>× gunstige cardiorenale effecten</li> </ul> <p><b>Nadelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× genitale schimmelinfectie</li> <li>× mogelijk orthostatisme (vooral bij ouderen)</li> </ul> <p><b>Opletten:</b> Niet geschikt bij ernstige nierinsufficiëntie en leverproblemen.</p>



Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
<b>Combinatiepreparaten</b>	Metformine + Vildagliptine	Eucreas®	Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke geneesmiddelen
	Metformine + Sitagliptine	Janumet® Sitagliptin/Metformine	Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke geneesmiddelen
	Metformine + Linagliptine	Jentadueto®	Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke geneesmiddelen
	Metformine + Alogliptine	Vipdomet®	Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke geneesmiddelen
	Metformine + Empagliflozine	Synjardy®	Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke geneesmiddelen
	Metformine + Dapagliflozine	Xigduo®	Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke geneesmiddelen

**TIP:** Alle patiëntenbijsluiters van de geneesmiddelen op de Belgische markt zijn online beschikbaar op de website van het FAGG:

[www.fagg-afmps.be](http://www.fagg-afmps.be).